

Глава 5

Условия второго порядка в вариационном исчислении

В этой главе даны необходимые и достаточные условия экстремума в простейшей задаче вариационного исчисления и задаче Больца. Это классические условия — условия Лежандра, Якоби, Вейерштрасса и другие. Причем эти условия будут выведены как следствия принципа максимума. Условие Вейерштрасса будет также выведено без принципа максимума с помощью игольчатых вариаций. При выводе достаточных условий в простейшей задаче вариационного исчисления будет строиться поле экстремалей, выводиться основная формула Вейерштрасса. Формулируется и доказывается отдельно теорема о необходимых и достаточных условиях экстремума в простейшей задаче вариационного исчисления и задаче Больца с квадратичным функционалом. Аналогичные необходимые и достаточные условия экстремума могут быть получены и в других задачах (изопериметрической задаче, задаче со старшими производными, задаче Лагранжа).

1 Простейшая задача вариационного исчисления

Рассмотрим простейшую задачу вариационного исчисления (для определенности задачу на минимум)

$$J(x(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt \rightarrow \min; \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1. \quad (P)$$

1.1 Сильный и слабый экстремум

Задачу (P) мы рассматривали на слабый экстремум. Иногда чтобы подчеркнуть, что задача рассматривается на слабый экстремум, мы будем писать $P(W)$. Множество допустимых элементов в задаче на слабый экстремум $D(P(W))$ составляют непрерывно дифференцируемые функции класса $C^1([t_0, t_1])$ с заданными условиями на концах.

Напомним, что функция $\hat{x} \in D(P(W))$ доставляет *слабый локальный минимум* в задаче (P) ($\hat{x} \in \text{wlocmin} P$), если она доставляет локальный минимум в пространстве $C^1([t_0, t_1])$, т.е. если существует $\delta > 0$ такое, что $J(x) \geq J(\hat{x})$ для любой функции $x \in D(P(W))$, для которой $\|x(\cdot) - \hat{x}(\cdot)\|_{C^1([t_0, t_1])} < \delta$.

Наряду со слабым экстремумом простейшую задачу вариационного исчисления будем рассматривать на сильный экстремум $P(S)$ (буква S — начальная буква слова strong — сильный). Множество допустимых элементов в задаче на сильный экстремум $D(P(S))$ составляют кусочно-дифференцируемые функции класса $PC^1([t_0, t_1])$ с заданными условиями на концах.

Функция $\hat{x} \in D(P(S))$ доставляет *сильный локальный минимум* в задаче (P) ($\hat{x} \in \text{strlocmin} P$), если она доставляет локальный минимум в пространстве $C([t_0, t_1])$, т.е. если существует $\delta > 0$ такое, что $J(x) \geq J(\hat{x})$ для любой функции $x \in D(P(S))$, для которой $\|x(\cdot) - \hat{x}(\cdot)\|_{C([t_0, t_1])} < \delta$.

Так как множество функций, среди которых доставляется сильный экстремум, шире, чем для слабого экстремума, то если

функция $\hat{x} \in C^1([t_0, t_1])$ доставляет сильный, то она доставляет и слабый экстремум. Поэтому для функций $\hat{x} \in C^1([t_0, t_1])$ необходимое условие слабого экстремума является необходимым условием сильного, а достаточное условие сильного экстремума является достаточным условием слабого.

1.2 Пример слабого, но не сильного экстремума

Приведем пример задачи, в которой допустимая экстремаль доставляет слабый локальный минимум, но не доставляет сильного локального минимума.

Пример.
$$\int_0^1 \dot{x}^3 dt \rightarrow \min; \quad x(0) = 0, \quad x(1) = 1.$$

Необходимое условие слабого, а значит и сильного экстремума — уравнение Эйлера:

$$-\frac{d}{dt}L_{\dot{x}} + L_x = 0 \iff \frac{d}{dt}3\dot{x}^2 = 0 \iff 3\dot{x}^2 = C \iff \dot{x} = \text{const.}$$

Общее решение уравнения Эйлера: $x = C_1 t + C_2$. Из условий на концах находим, что $C_1 = 1$, $C_2 = 0$. Таким образом, имеется единственная допустимая экстремаль $\hat{x} = t$. Покажем, что она доставляет слабый локальный минимум в задаче ($\hat{x} \in \text{wlocmin}$). Действительно, если $h \in C_0^1([0, 1])$, то для функционала $J(x) = \int_0^1 \dot{x}^3 dt$ имеем

$$\begin{aligned} J(\hat{x} + h) - J(\hat{x}) &= \int_0^1 (\dot{\hat{x}} + \dot{h})^3 dt - \int_0^1 \dot{\hat{x}}^3 dt = \int_0^1 (1 + \dot{h})^3 dt - \\ &- \int_0^1 1^3 dt = \int_0^1 (3\dot{h} + 3\dot{h}^2 + \dot{h}^3) dt = \int_0^1 \dot{h}^2(3 + \dot{h}) dt, \quad (*) \end{aligned}$$

так как $\int_0^1 \dot{h} dt = h(1) - h(0) = 0$. Отсюда видно, что если $\|h\|_1 < 3$, то $3 + \dot{h}(t) > 0$ и, значит, $J(\hat{x} + h) \geq J(\hat{x})$, т. е. $\hat{x} \in \text{wlocmin}$.

Покажем, что \hat{x} не доставляет сильного локального минимума ($\hat{x} \notin \text{strlocmin}$). Рассмотрим последовательность функций h_n ($n > 1$) такую, что

$$\dot{h}_n(t) = \begin{cases} -\sqrt{n}, & t \in [0, \frac{1}{n}], \\ 0, & t \in (\frac{1}{n}, \frac{1}{2}), \\ \frac{2}{\sqrt{n}}, & t \in [\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$$

Тогда

$$h_n(t) = \int_0^t \dot{h}_n(\tau) d\tau = \begin{cases} -\sqrt{n}t, & t \in [0, \frac{1}{n}], \\ -\frac{1}{\sqrt{n}}, & t \in (\frac{1}{n}, \frac{1}{2}), \\ \frac{2t}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n}}, & t \in [\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$$

Легко понять, что $h_n \in PC_0^1([0, 1])$ и $\|h_n\|_{C([0, 1])} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Положим $x_n = \hat{x} + h_n$. Получим последовательность допустимых (в задаче на сильный экстремум) функций x_n , $x_n(\cdot) \rightarrow \hat{x}(\cdot)$ в метрике пространства $C([0, 1])$, для которых в силу (*)

$$\begin{aligned} J(x_n) - J(\hat{x}) &= \int_0^1 \dot{h}_n^2 (3 + \dot{h}_n) dt = \int_0^{1/n} n(3 - \sqrt{n}) dt + \int_{1/2}^1 \frac{4}{n} \left(3 + \frac{2}{\sqrt{n}}\right) dt = \\ &= 3 - \sqrt{n} + \frac{6}{n} + \frac{4}{n\sqrt{n}} \rightarrow -\infty, \end{aligned}$$

при $n \rightarrow \infty$, т. е. функция \hat{x} не доставляет сильного локального минимума ($\hat{x} \notin \text{strlocmin}$), более того $S_{\text{strabsmin}} = -\infty$.

Ниже в п. 1.4.3 в лемме о скруглении углов покажем, $S_{\text{strabsmin}P} = S_{\text{wabsmin}P}$. В нашей задаче можно было построить последовательность допустимых функций \tilde{x}_n класса C^1 такую, что $J(\tilde{x}_n) \rightarrow -\infty$, т. е. сгладить функции x_n .

1.3 Условия Лежандра, Якоби, Вейерштрасса

Рассмотрим простейшую задачу вариационного исчисления, для определенности задачу на минимум

$$J(x(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt \rightarrow \inf; \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1. \quad (P)$$

Пусть $\hat{x}(\cdot) \in C^1([t_0, t_1])$ — некоторая фиксированная допустимая ($\hat{x}(t_0) = x_0, \hat{x}(t_1) = x_1$) экстремаль (т. е. функция \hat{x} удовлетворяет уравнению Эйлера). Далее предполагаем, что интегрант L по меньшей мере дважды непрерывно дифференцируем в некоторой окрестности расширенного графика $\Gamma_{\hat{x}\dot{x}}$ ($L \in C^2(\mathcal{O}(\Gamma_{\hat{x}\dot{x}}))$).

Возьмем функцию $h \in C_0^1([t_0, t_1])$. Пусть $\hat{x} \in \text{wlocmin}P$, тогда функция одного переменного

$$\varphi(\lambda) = J(\hat{x}(\cdot) + \lambda h(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, \hat{x}(t) + \lambda h(t), \dot{\hat{x}}(t) + \lambda \dot{h}(t)) dt$$

имеет минимум при $\lambda = 0$. Из условий, наложенных на гладкость функции L , следует, что функция $\varphi(\lambda)$ дважды дифференцируема в нуле. Поэтому по необходимому условию минимума первого порядка (по теореме Ферма) $\varphi'(0) = 0$, т. е.

$$\varphi'(0) = \int_{t_0}^{t_1} \left(\hat{L}_{\dot{x}}(t) \dot{h}(t) + \hat{L}_x(t) h(t) \right) dt = 0 \quad \forall h \in C_0^1([t_0, t_1]). \quad (1)$$

В главе 3 п. 1.3 было показано, что из соотношения (1) следует уравнение Эйлера — необходимое условие первого порядка слабого экстремума.

По необходимому условию второго порядка минимума для

функции одной переменной $\varphi''(0) \geq 0$, т. е.

$$\varphi''(0) = \int_{t_0}^{t_1} \left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \dot{h}^2(t) + 2\hat{L}_{x\dot{x}}(t) \dot{h}(t)h(t) + \hat{L}_{xx}(t)h^2(t) \right) dt \geq 0$$

$$\forall h \in C_0^1([t_0, t_1]). \quad (2)$$

Из соотношения (2) выводятся условия второго порядка минимума в простейшей задаче вариационного исчисления. Важную роль играет коэффициент $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t)$ при \dot{h}^2 .

Говорим, что на экстремали \hat{x} выполнено *условие Лежандра*, если $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \geq 0 \forall t \in [t_0, t_1]$ и *усиленное условие Лежандра*, если $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) > 0 \forall t \in [t_0, t_1]$.

В векторном случае $x = (x_1, \dots, x_n) \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$,

$$L_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{pmatrix} L_{\dot{x}_1\dot{x}_1} & \cdots & L_{\dot{x}_1\dot{x}_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ L_{\dot{x}_n\dot{x}_1} & \cdots & L_{\dot{x}_n\dot{x}_n} \end{pmatrix}, \quad L_{\dot{x}x} = \begin{pmatrix} L_{\dot{x}_1x_1} & \cdots & L_{\dot{x}_1x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ L_{\dot{x}_nx_1} & \cdots & L_{\dot{x}_nx_n} \end{pmatrix},$$

$$L_{x\dot{x}} = \begin{pmatrix} L_{x_1\dot{x}_1} & \cdots & L_{x_1\dot{x}_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ L_{x_n\dot{x}_1} & \cdots & L_{x_n\dot{x}_n} \end{pmatrix}, \quad L_{xx} = \begin{pmatrix} L_{x_1x_1} & \cdots & L_{x_1x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ L_{x_nx_1} & \cdots & L_{x_nx_n} \end{pmatrix}$$

— матрицы размера $n \times n$. Отметим, что матрица $L_{\dot{x}\dot{x}}(t)$ является транспонированной к матрице $L_{x\dot{x}}(t)$ и $\langle L_{x\dot{x}}\dot{h}, h \rangle = \langle \dot{h}, L_{\dot{x}\dot{x}}^*h \rangle = \langle \dot{h}, L_{\dot{x}\dot{x}}h \rangle$. Условие $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \geq 0$ означает неотрицательную определенность матрицы, условие $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) > 0$ — положительную определенность матрицы. Соотношение (2) можно переписать в виде

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\langle \hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}\dot{h}, \dot{h} \rangle + 2\langle \hat{L}_{x\dot{x}}\dot{h}, h \rangle + \langle \hat{L}_{xx}h, h \rangle \right) dt \geq 0 \quad \forall h \in C_0^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n).$$

Пусть далее $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}, \hat{L}_{x\dot{x}}, \hat{L}_{xx} \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^{n^2})$ и выполнено усиленное условие Лежандра. Уравнение Эйлера по h для инте-

$$\begin{aligned} \text{гранта } \tilde{L} &= \tilde{L}(t, h, \dot{h}) := \hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t)\dot{h}^2(t) + 2\hat{L}_{x\dot{x}}(t)\dot{h}(t)h(t) + \hat{L}_{xx}(t)h^2(t) \\ &- \frac{d}{dt}\tilde{L}_h(t) + \tilde{L}_h(t) = 0 \iff \\ &- \frac{d}{dt}\left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t)\dot{h}(t) + \hat{L}_{x\dot{x}}(t)h(t)\right) + \hat{L}_{x\dot{x}}(t)\dot{h}(t) + \hat{L}_{xx}(t)h(t) = 0 \end{aligned}$$

называется *уравнением Якоби* для исходной задачи на экстремали \hat{x} .

Точка τ называется *сопряженной к точке* t_0 , если для решения уравнения Якоби $h(\cdot)$ с начальными данными $h(t_0) = 0$, $\dot{h}(t_0) = 1$ (или $\dot{h}(t_0) \neq 0$), функция h в точке τ обращается в ноль ($h(\tau) = 0$). Говорят, что на \hat{x} выполнено *условие Якоби*, если в интервале (t_0, t_1) нет точек, сопряженных с t_0 , и *усиленное условие Якоби*, если в полуинтервале $(t_0, t_1]$ нет точек, сопряженных с t_0 .

Уравнение Якоби — линейное дифференциальное уравнение второго порядка, которое (из-за усиленного условия Лежандра) можно разрешить относительно второй производной.

Для вектор-функций $x = (x_1, \dots, x_n)$ ищется фундаментальная система решений уравнения Якоби — матрица $H(t) =$

$$(h^1(t) \dots h^n(t)) = \begin{pmatrix} h_1^1(t) & \dots & h_1^n(t) \\ \dots & \dots & \dots \\ h_n^1(t) & \dots & h_n^n(t) \end{pmatrix} \text{ с начальными условиями}$$

ми $H(t_0) = 0$ (нулевая матрица), $\dot{H}(t_0) = I$ (единичная матрица)

или $\det \dot{H}(t_0) \neq 0$. Вектор-столбцы $h^i = \begin{pmatrix} h_1^i \\ \vdots \\ h_n^i \end{pmatrix}$ — решения систе-


мы уравнений Якоби. Точка τ называется *сопряженной к точке* t_0 , если матрица $H(\cdot)$ является вырожденной, т. е. $\det H(\tau) = 0$.

Пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемая функция n переменных. Функцию

$$\mathcal{E}(x, x') := f(x') - f(x) - f'(x)(x' - x)$$

назовем *функцией Вейерштрасса* функции f . Геометрический смысл функции \mathcal{E} таков: $\mathcal{E}(x, x')$ — разность в точке x' между

значением f и значением аффинной функции, касательной к графику f в точке x . Отсюда ясно, что если f выпукла, то $\mathcal{E}(x, x') \geq 0$. Можно показать, что верно и обратное.



Пусть $L(t, x, \dot{x})$ — интегрант простейшей задачи вариационного исчисления. Функция

$$\mathcal{E}(t, x, \dot{x}, u) := L(t, x, u) - L(t, x, \dot{x}) - L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x})(u - \dot{x})$$

называется *функцией Вейерштрасса интегранта L* . Таким образом, $\mathcal{E}(t, x, \dot{x}, u)$ — функция Вейерштрасса функции $\dot{x} \rightarrow L(t, x, \dot{x})$, где t, x играют роль параметров. Говорят, что на экстремали \hat{x} выполнено *условие Вейерштрасса*, если

$$\mathcal{E}(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t), u) = L(t, \hat{x}(t), u) - L(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)) - \hat{L}_{\dot{x}}(t)(u - \dot{\hat{x}}(t)) \geq 0 \\ \forall u \in \mathbb{R}^n, \forall t \in [t_0, t_1].$$

Геометрический смысл условия Вейерштрасса на экстремали \hat{x} : для любого фиксированного $t \in [t_0, t_1]$ график функции $L = L(\dot{x}) = L(t, \hat{x}(t), \dot{x})$ (как функции от \dot{x}) лежит выше касательной к кривой L в точке $\dot{\hat{x}}(t)$.

Если функция $L(\dot{x})$ выпуклая по \dot{x} для любых t, x , то условие Вейерштрасса выполняется на любой экстремали \hat{x} .

1.4 Необходимые и достаточные условия слабого и сильного экстремума

Рассмотрим простейшую задачу вариационного исчисления для вектор-функций $x = (x_1, \dots, x_n)$ (для определенности задачу на

минимум)

$$J(x(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt \rightarrow \inf; \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1. \quad (\text{P})$$

1.4.1 Игольчатые вариации. Условие Вейерштрасса

Понятие сильного экстремума ввел в вариационное исчисление Вейерштрасс. Для доказательства необходимого условия сильного минимума Вейерштрасс употребил специальные вариации экстремальной функции \hat{x} вида $x_\lambda(t) = \hat{x}(t) + h_\lambda(t)$, где $\lambda \geq 0$,

$$h_\lambda(t) = h_\lambda(t; \tau, \xi) = \begin{cases} \xi\lambda + (t - \tau)\xi, & t \in [\tau - \lambda, \tau], \\ \xi\lambda - (t - \tau)\xi\sqrt{\lambda}, & t \in [\tau, \tau + \sqrt{\lambda}], \\ 0, & t \notin [\tau - \lambda, \tau + \sqrt{\lambda}], \end{cases} \quad (\xi \in \mathbb{R}^n).$$




Рис. 11

Производная вариации $h_\lambda(t)$ имеет вид, изображенный на рис. 11 (для удобства изображения взято $n = 1$, $\xi > 0$). При малом λ изменение функции \hat{x} производится на очень маленьком отрезке, в связи с чем подобные вариации называют “игольчатыми”.

Эти вариации приспособлены к исследованию задач на сильный экстремум. Игольчатые вариации несколько иного вида использовались при доказательстве принципа максимума Понтрягина.

Очевидно, что $x_\lambda(\cdot) \rightarrow \hat{x}(\cdot)$ в метрике пространства $C([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ при $\lambda \rightarrow 0$.

С помощью игольчатых вариаций докажем условие Вейерштрасса — необходимое условие сильного минимума в простейшей задаче вариационного исчисления на классе кусочно-гладких функций.

Теорема. Пусть функция \hat{x} доставляет сильный локальный минимум в задаче (P) ($\hat{x} \in \text{strlocmin} P$), интегрант L непрерывно дифференцируем в некоторой окрестности расширенного графика $\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}} = \{(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)) \mid t \in [t_0, t_1]\}$, $T \subset [t_0, t_1]$ — множество точек непрерывности функции \hat{x} . Тогда на \hat{x} выполняется условие Вейерштрасса

$$\mathcal{E}(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t), u) = L(t, \hat{x}(t), u) - L(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)) - \hat{L}_{\dot{x}}(t)(u - \dot{\hat{x}}(t)) \geq 0 \\ \forall u \in \mathbb{R}^n, \forall t \in T.$$

Доказательство. Возьмем точку $\tau \in (t_0, t_1) \cap T$ (случаи $\tau = t_0, t_1$ доказываются предельными переходами $\tau \rightarrow t_0, \tau \rightarrow t_1$ в неравенстве). Рассмотрим вписанную выше игольчатую вариацию $x_\lambda(t) = \hat{x}(t) + h_\lambda(t)$ функции \hat{x} . При достаточно малых $\lambda \geq 0$ отрезок $[\tau - \lambda, \tau + \sqrt{\lambda}] \subset T$, функция x_λ допустима в задаче на сильный экстремум ($x_\lambda \in D(P(S))$): $x_\lambda \in PC^1([t_0, t_1])$, $x_\lambda(t_i) = \hat{x}(t_i) + h_\lambda(t_i) = x_i, i = 0, 1$. Очевидно, что функция $x_\lambda(\cdot) \rightarrow \hat{x}(\cdot)$ в метрике пространства $C([t_0, t_1])$ при $\lambda \rightarrow 0$.

Поскольку $\hat{x} \in \text{strlocmin} P$, то функция одного переменного $\varphi(\lambda) = J(x_\lambda) = J(\hat{x} + h_\lambda)$ имеет минимум при $\lambda = 0$, т.е. $\varphi(\lambda) \geq \varphi(0)$. Отсюда следует, что если производная справа в нуле $\varphi'(+0)$ существует, то $\varphi'(+0) \geq 0$. Вычислим $\varphi'(+0)$. Поскольку функции $\hat{x}(t)$ и $x_\lambda(t)$ совпадают при $t \in [t_0, \tau - \lambda]$ и $t \in [\tau + \sqrt{\lambda}, t_1]$ то, разбивая отрезок интегрирования $[t_0, t_1]$ на

четыре отрезка, имеем

$$\begin{aligned}
 \varphi'(+0) &= \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{J(x_\lambda) - J(\hat{x})}{\lambda} = \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{t_0}^{t_1} \left(L(t, x_\lambda, \dot{x}_\lambda) - L(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) \right) dt = \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau-\lambda}^{\tau} \left(L(t, x_\lambda, \dot{x}_\lambda + \xi) - \hat{L}(t) \right) dt + \\
 &+ \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} \left(L(t, x_\lambda, \dot{x}_\lambda) - L(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) \right) dt =: J_1 + J_2.
 \end{aligned}$$

По теореме о среднем для определенных интегралов

$$J_1 = L(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau) + \xi) - \hat{L}(\tau).$$

Из условий гладкости, наложенных на интегрант L , вытекает дифференцируемость по Фреше отображения $L: C^1([\tau, \tau + \sqrt{\lambda}], \mathbb{R}^n) \rightarrow C([\tau, \tau + \sqrt{\lambda}], \mathbb{R}^n)$, действующего по формуле $L(x(\cdot)) = L(t, x(t), \dot{x}(t))$. По определению дифференцируемости по Фреше

$$L(x_\lambda) - L(\hat{x}) = L(\hat{x} + h_\lambda) - L(\hat{x}) = L'(\hat{x})[h_\lambda] + r(h_\lambda) = \hat{L}_x h_\lambda + \hat{L}_{\dot{x}} \dot{h}_\lambda + r(h_\lambda),$$

где $\|r(h_\lambda)(\cdot)\|_{C([\tau, \tau + \sqrt{\lambda}])} = o(\|h_\lambda(\cdot)\|_{C^1([\tau, \tau + \sqrt{\lambda}])}) = o(\sqrt{\lambda})$, так как $\|h_\lambda(\cdot)\|_{C^1([\tau, \tau + \sqrt{\lambda}])} \stackrel{\text{def}}{=} \max \{ \|h_\lambda\|_{C([\tau, \tau + \sqrt{\lambda}])}, \|\dot{h}_\lambda\|_{C([\tau, \tau + \sqrt{\lambda}])} \} = \max \{ |\xi|\lambda, |\xi|\sqrt{\lambda} \} = |\xi|\sqrt{\lambda}$. Поэтому

$$\begin{aligned}
 J_2 &= \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} \left(\hat{L}_x h_\lambda + \hat{L}_{\dot{x}} \dot{h}_\lambda + r(h_\lambda) \right) dt = \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} \hat{L}_x (\xi\lambda - (t - \tau)\xi\sqrt{\lambda}) dt + \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} \hat{L}_{\dot{x}} (-\xi\sqrt{\lambda}) dt +
 \end{aligned}$$

$$+ \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} r(h_{\lambda}) dt =: A_1 + A_2 + A_3.$$

Используя теорему о среднем для определенных интегралов, найдем величины A_1, A_2, A_3 :

$$A_1 = \lim_{\lambda \rightarrow +0} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} \hat{L}_x \xi dt - \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} \hat{L}_x \cdot (t - \tau) \xi dt = 0,$$

$$A_2 = - \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} \hat{L}_{\dot{x}} \xi dt = -\hat{L}_{\dot{x}}(\tau) \xi,$$

$$\begin{aligned} |A_3| &\leq \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} |r(h_{\lambda})| dt \leq \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau}^{\tau+\sqrt{\lambda}} \|r(h_{\lambda})(\cdot)\|_{C([\tau, \tau+\sqrt{\lambda}])} dt = \\ &= \frac{o(\sqrt{\lambda})}{\sqrt{\lambda}} \rightarrow 0 \Rightarrow A_3 = 0. \end{aligned}$$

В итоге, $J_2 = -\hat{L}_{\dot{x}}(\tau) \xi$ и

$$\varphi'(+0) = L(\tau, \hat{x}(\tau), \hat{x}(\tau) + \xi) - \hat{L}(\tau) - \hat{L}_{\dot{x}}(\tau) \xi \geq 0.$$

Нетрудно видеть, что выписанное условие Вейерштрасса является тем же самым, что и в формулировке теоремы, где $t = \tau$, $u = \hat{x}(\tau) + \xi$. Условие Вейерштрасса доказано. \triangleright

В задаче на максимум условие Вейерштрасса меняет свой знак.

1.4.2 Необходимое условие сильного экстремума — неравенство (γ)

Выведем еще одно неравенство, которое назовем неравенством (γ) , являющееся необходимым условием сильного минимума.

При этом доказательство неравенства будет существенно проще доказательства условия Вейерштрасса, а условием гладкости является просто непрерывность интегранта L . Для функции L , дифференцируемой по \dot{x} в точке $\dot{x}(t)$, неравенство будет совпадать с условием Вейерштрасса.

Рассмотрим следующие вариации допустимой экстремали \hat{x} . Пусть точка $\tau \in (t_0, t_1)$ и произвольные числа $\xi, \eta > 0$ фиксированы. Положим $x_\lambda(t) = \hat{x}(t) + h_\lambda(t)$, где $\lambda \geq 0$,

$$h_\lambda(t) = \begin{cases} \xi\lambda + (t - \tau)\xi, & t \in [\tau - \lambda, \tau], \\ \xi\lambda - (t - \tau)\eta, & t \in [\tau, \tau + \frac{\lambda\xi}{\eta}], \\ 0, & t \notin [\tau - \lambda, \tau + \frac{\lambda\xi}{\eta}]. \end{cases}$$




Рис. 11

При $\eta = \xi\sqrt{\lambda}$ вариации совпадают с вариациями Вейерштрасса.

Теорема. Пусть функция \hat{x} доставляет сильный локальный минимум в задаче (P) ($\hat{x} \in \text{strlocmin}P$), интегрант L непрерывен в некоторой окрестности множества расширенного графика $\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}$ ($L \in C(\mathcal{O}(\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}))$), $T \subset [t_0, t_1]$ — множество точек непрерывности функции \hat{x} . Тогда на $\dot{x} := \dot{\hat{x}}(\tau)$ выполняется условие

$$L(\dot{x}) \leq \frac{\eta}{\xi + \eta} L(\dot{x} + \xi) + \frac{\xi}{\xi + \eta} L(\dot{x} - \eta) \quad \forall \xi, \eta > 0, \quad \forall \tau \in T. \quad (\gamma)$$

Доказательство. Возьмем точку $\tau \in (t_0, t_1) \cap T$ (случаи $\tau = t_0, t_1$ доказываются предельными переходами $\tau \rightarrow t_0, \tau \rightarrow t_1$ в неравенстве (γ)). Рассмотрим выписанную выше игольчатую вариацию $x_\lambda(t) = \hat{x}(t) + h_\lambda(t)$ функции \hat{x} . При достаточно малых $\lambda \geq 0$ отрезок $[\tau - \lambda, \tau + \frac{\lambda\xi}{\eta}] \subset T$, функция x_λ допустима в задаче на сильный экстремум ($x_\lambda \in D(P(S))$): $x_\lambda \in PC^1([t_0, t_1])$, $x_\lambda(t_i) = \hat{x}(t_i) + h_\lambda(t_i) = x_i, i = 0, 1$. Очевидно, что функция $x_\lambda(\cdot) \rightarrow \hat{x}(\cdot)$ в метрике пространства $C([t_0, t_1])$ при $\lambda \rightarrow 0$.

Поскольку $\hat{x} \in \text{strlocmin}P$, то функция одного переменного $\varphi(\lambda) = J(x_\lambda) = J(\hat{x} + h_\lambda)$ имеет минимум при $\lambda = 0$, т.е. $\varphi(\lambda) \geq \varphi(0)$. Отсюда следует, что если производная справа в нуле $\varphi'(+0)$ существует, то $\varphi'(+0) \geq 0$. Вычислим $\varphi'(+0)$. Поскольку функции $\hat{x}(t)$ и $x_\lambda(t)$ совпадают при $t \in [t_0, \tau - \lambda]$ и $t \in [\tau + \frac{\lambda\xi}{\eta}, t_1]$ то, разбивая отрезок интегрирования $[t_0, t_1]$ на четыре отрезка, имеем

$$\begin{aligned} \varphi'(+0) &= \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{J(x_\lambda) - J(\hat{x})}{\lambda} = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{t_0}^{t_1} \left(L(t, x_\lambda, \dot{x}_\lambda) - L(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) \right) dt = \end{aligned}$$

(интегралы на промежутках интегрирования $[t_0, \tau - \lambda], [\tau + \frac{\lambda\xi}{\eta}, t_1]$ обращаются в ноль)

$$\begin{aligned} &= \lim_{\lambda \rightarrow +0} \frac{1}{\lambda} \int_{\tau - \lambda}^{\tau} \left(L(t, x_\lambda, \dot{\hat{x}} + \xi) - \hat{L}(t) \right) dt + \lim_{\lambda \rightarrow +0} \underbrace{\frac{1}{\lambda}}_{\substack{\parallel \\ \xi \\ \frac{1}{\eta} \frac{\lambda\xi}{\eta}}} \int_{\tau}^{\tau + \frac{\lambda\xi}{\eta}} \left(L(t, x_\lambda, \dot{\hat{x}} - \eta) - \hat{L}(t) \right) dt = \end{aligned}$$

(по теореме о среднем для определенных интегралов)

$$= L(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau) + \xi) - \hat{L}(\tau) + \frac{\xi}{\eta} \left(L(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau) - \eta) - \hat{L}(\tau) \right) \geq 0 \iff$$

(умножим обе части неравенства на η)


$$\eta L(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau) + \xi) + \xi L(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau) - \eta) - (\xi + \eta) \hat{L}(\tau) \geq 0 \iff$$

(разделим обе части неравенства на $\xi + \eta$)

$$L(\dot{x}) \leq \frac{\eta}{\xi + \eta} L(\dot{x} + \xi) + \frac{\xi}{\xi + \eta} L(\dot{x} - \eta) \quad \forall \xi, \eta > 0, \quad \forall \tau \in T.$$

Неравенство (γ) доказано. \triangleright

Геометрический смысл условия (γ) на экстремали \hat{x} : для любого фиксированного $t \in T$ точка $(\dot{\hat{x}}(t), L(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)))$ лежит ниже любой хорды с концами по разные стороны от \dot{x} графика функции $L = L(\dot{x}) = L(t, \hat{x}(t), \dot{x})$ (как функции от \dot{x}).



Иными словами, точка $(\dot{x}, L(\dot{x}))$ лежит ниже соответствующей точки на хорде $(\dot{x} - \eta, L(\dot{x} - \eta)), (\dot{x} + \xi, L(\dot{x} + \xi))$. Действительно, выпуклая комбинация точек $\frac{\xi}{\xi + \eta} (\dot{x} - \eta, L(\dot{x} - \eta)) + \frac{\eta}{\xi + \eta} (\dot{x} + \xi, L(\dot{x} + \xi))$ равняется $(\dot{x}, \frac{\xi}{\xi + \eta} L(\dot{x} - \eta) + \frac{\eta}{\xi + \eta} L(\dot{x} + \xi))$ (равенство для первых координат $\frac{\xi}{\xi + \eta} (\dot{x} - \eta) + \frac{\eta}{\xi + \eta} (\dot{x} + \xi) = \dot{x}$ проверяется непосредственным вычислением).

Для выпуклой функции $L(\dot{x})$ условие (γ) будет выполняться на любой функции $x \in PC^1([t_0, t_1])$.

Если L — дифференцируемая в точке \dot{x} функция, то из условия (γ) вытекает условие Вейерштрасса. Ниже условие Вейерштрасса будет выведено из принципа максимума Понтрягина.

1.4.3 Необходимые условия сильного экстремума

Теорема 1. Пусть функция $\hat{x} \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ доставляет сильный локальный минимум в задаче (P) ($\hat{x} \in \text{strlocmin} P$), интегрант L непрерывно дифференцируем в некоторой окрестности расширенного графика $\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}$ ($L \in C^1(\mathcal{O}(\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}))$). Тогда на \hat{x} выполняется уравнение Эйлера

$$-\frac{d}{dt}\hat{L}_{\dot{x}}(t) + \hat{L}_x(t) = 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

и удовлетворяется условие Вейерштрасса

$$E(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}, u) = L(t, \hat{x}, u) - L(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) - \hat{L}_{\dot{x}}(t)(u - \dot{\hat{x}}) \geq 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}^n, \quad \forall t \in [t_0, t_1].$$

Если при этом существует $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \quad \forall t \in [t_0, t_1]$, то выполняется также условие Лежандра: $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \geq 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1]$.

В задаче на максимум условия Лежандра и Вейерштрасса меняют свой знак.

Доказательство. Формализуем задачу (P) как задачу оптимального управления

$$\int_{t_0}^{t_1} L(t, x, u) dt \rightarrow \min; \quad \dot{x} = u, \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1. \quad (P')$$

Условие $\hat{x} \in \text{strlocmin} P$ равносильно тому, что пара (\hat{x}, \hat{u}) , где $\hat{u}(t) = \dot{\hat{x}}(t)$, является оптимальным процессом в задаче оптимального управления (P') . Поэтому согласно принципу максимума Понтрягина найдутся множители Лагранжа $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$ и $p(\cdot) \in PC^1([t_0, t_1])$, $\lambda \neq 0$, такие, что для функции Лагранжа задачи (P')

$$\Lambda = \int_{t_0}^{t_1} (\lambda_0 L(t, x, u) + p(t)(\dot{x} - u)) dt + \lambda_1(x(t_0) - x_0) + \lambda_2(x(t_1) - x_1)$$

выполняются условия:

а) уравнение Эйлера для интегранта $\tilde{L} = \lambda_0 L(t, x, u) + p(t)(\dot{x} - u)$:

$$-\frac{d}{dt}\tilde{L}_{\dot{x}}(t) + \tilde{L}_x(t) = 0 \iff -\dot{p}(t) + \lambda_0 \hat{L}_x(t) = 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1];$$

б) трансверсальности по x : $p(t_0) = \lambda_1$, $p(t_1) = -\lambda_2$;

с) оптимальности по u :

$$\min_{u \in \mathbb{R}^n} \underbrace{\{\lambda_0 L(t, \hat{x}(t), u) - p(t)u\}}_{f(u)} = \lambda_0 L(t, \hat{x}(t), \hat{x}(t)) - p(t)\hat{x}(t).$$

д) неотрицательности: $\lambda_0 \geq 0$.

Если $\lambda_0 = 0$, то из с) (поскольку минимум конечен и равен $-p(t)\hat{x}(t)$) вытекает, что $p(t) \equiv 0$, тогда из б) — что все множители Лагранжа нули.

Значит, $\lambda_0 \neq 0$. Полагаем в задаче на минимум $\lambda_0 = 1$. Тогда из с) по необходимому условию I порядка минимума функции $f(u) = L(t, \hat{x}(t), u) - p(t)u$ следует, что $f'(\hat{u}) = 0 \Leftrightarrow \hat{L}_u(t) - p(t) = 0 \Leftrightarrow \hat{L}_{\dot{x}}(t) = p(t)$, а по необходимому условию II порядка $f''(\hat{u}) \geq 0 \Leftrightarrow \hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \geq 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1]$. Подставляя $p = \hat{L}_{\dot{x}}$ в условие стационарности по x , получаем уравнение Эйлера для интегранта L . Условие оптимальности по u при $\lambda_0 = 1$ и $p = \hat{L}_{\dot{x}}$

$$L(t, \hat{x}(t), u) - \hat{L}_{\dot{x}}(t)u \geq L(t, \hat{x}(t), \hat{x}(t)) - \hat{L}_{\dot{x}}(t)\hat{x}(t) \quad \forall u \in \mathbb{R}^n, \forall t \in [t_0, t_1]$$

есть не что иное, как условие Вейерштрасса. \triangleright

Отметим, что выполнение уравнения Эйлера можно доказать и по-другому. Действительно, поскольку $\hat{x} \in \text{strlocmin} P \cap C^1$, то $\hat{x} \in \text{wlocmin} P$ и, следовательно, выполняется необходимое условие слабого минимума — уравнение Эйлера.

В дальнейшем нам придется использовать следующий результат.

1.4.4 Лемма о скруглении углов

Пусть функция $\hat{x} \in PC^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$, интегрант $L \in C(\mathbb{R}^{2n+1})$. Тогда существует последовательность гладких функций $\{x_k\}_{k \geq 1} \in$

$C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$, $x_k(t_0) = \hat{x}(t_0)$, $x_k(t_1) = \hat{x}(t_1)$, такая, что $x_k(\cdot) \rightarrow \hat{x}(\cdot)$ в метрике пространства $C([t_0, t_1])$, и $\lim_{k \rightarrow \infty} J(x_k) = J(\hat{x})$.

◁ Для простоты записи проведем доказательство для $n = 1$.

Возьмем функцию
$$h(t) = \begin{cases} \frac{(|t| - 1)^2}{4}, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$




Рис.

Она непрерывна, а ее производная при $t = 0$ имеет скачок величины -1 , $|h(t)| \leq \frac{1}{4}$, $|\dot{h}(t)| \leq \frac{1}{2}$. Пусть $\tau_i \in (t_0, t_1)$, $i = 1, \dots, m$, — точки разрыва производной $\dot{\hat{x}}$ и $\Delta_i = \dot{\hat{x}}(\tau_i + 0) - \dot{\hat{x}}(\tau_i - 0)$ — ее скачки в этих точках. Функция $h_k(\cdot, \tau_i) = \frac{1}{k} h(k(\cdot - \tau_i))$, график которой получается из графика функции h преобразованиями сдвига и подобия отлична от нуля на интервале $(\tau_i - \frac{1}{k}, \tau_i + \frac{1}{k})$, непрерывна, а ее производная непрерывна всюду кроме точки τ_i , где производная по-прежнему имеет скачок равный -1 , кроме того $|h_k(t, \tau_i)| \leq \frac{1}{4k}$, $|\dot{h}_k(t, \tau_i)| \leq \frac{1}{2}$.

Тогда функция $x_k(t) = \hat{x}(t) + \sum_{i=1}^m \Delta_i h_k(t, \tau_i)$ непрерывна вместе со своей производной на всем отрезке $[t_0, t_1]$, причем $x_k(t) = \hat{x}(t)$ вне отрезков $[\tau_i - \frac{1}{k}, \tau_i + \frac{1}{k}]$. В частности, для достаточно больших k эти отрезки не перекрываются, $x_k(t_0) = \hat{x}(t_0)$, $x_k(t_1) = \hat{x}(t_1)$,

$$|x_k(t) - \hat{x}(t)| = \left| \sum_{i=1}^m \Delta_i h_k(t, \tau_i) \right| \leq \frac{1}{4k} \max_i |\Delta_i| = \frac{\Delta}{4k} \rightarrow 0 \text{ при } k \rightarrow +\infty,$$

$$|\dot{x}_k(t) - \dot{\hat{x}}(t)| = \left| \sum_{i=1}^m \Delta_i \dot{h}_k(t, \tau_i) \right| \leq \frac{1}{2} \max_i |\Delta_i| = \frac{\Delta}{2} \quad (\Delta := \max_i |\Delta_i|).$$

На компакте $\left\{ (t, x, \dot{x}) \mid t_0 \leq t \leq t_1, |x - \hat{x}(t)| \leq \frac{\Delta}{4k_0}, |\dot{x} - \dot{\hat{x}}(t)| \leq \frac{\Delta}{2} \right\}$ непрерывная функция L ограничена: $|L(t, x, \dot{x})| \leq M$. Поэтому при достаточно больших k

$$\begin{aligned} |J(x_k) - J(\hat{x})| &= \left| \int_{t_0}^{t_1} L(t, x_k, \dot{x}_k) dt - \int_{t_0}^{t_1} L(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) dt \right| = \\ &= \left| \sum_{i=1}^m \int_{\tau_i - \frac{1}{k}}^{\tau_i + \frac{1}{k}} \left(L(t, x_k, \dot{x}_k) - L(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) \right) dt \right| \leq \frac{4Mm}{k} \end{aligned}$$

и, следовательно, $J(x_k) \rightarrow J(\hat{x})$ при $k \rightarrow +\infty$. \triangleright

Следствие. Абсолютный экстремум в задаче (P) на сильный и слабый экстремум совпадают: $S_{\text{strabsmin}P} = S_{\text{wabsmin}P}$.

Для локальных экстремумов это может быть не так (см. п. 1.2.).

1.4.5 Необходимые условия слабого экстремума

Теорема 2. Пусть функция $\hat{x} \in C^2([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ доставляет слабый локальный минимум в задаче (P) ($\hat{x} \in \text{wlocmin}P$), интегрант L трижды непрерывно дифференцируем в некоторой окрестности расширенного графика $\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}$ ($L \in C^3(\mathcal{O}(\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}))$). Тогда на \hat{x} выполняется уравнение Эйлера, условие Лежандра, а если на экстремали \hat{x} выполнено усиленное условие Лежандра ($\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) > 0 \forall t \in [t_0, t_1]$), то выполняется и условие Якоби (на интервале (t_0, t_1) нет сопряженных точек).

В задаче на максимум условие Лежандра меняет свой знак.

Доказательство. Для простоты записи проведем доказательство для $n = 1$.

1) *Вывод уравнения Эйлера и условия Лежандра.* Поскольку функция $\hat{x} \in \text{wlocmin}P$, то для любой функции $h \in C_0^1([t_0, t_1])$ функция $\varphi(\lambda) = J(\hat{x}(\cdot) + \lambda h(\cdot))$ имеет локальный минимум в нуле. Тогда по необходимому условию минимума функции одного переменного $\varphi'(0) = 0$ и $\varphi''(0) \geq 0$. В главе 3 п. 1.3 было показано, что первое условие равносильно выполнению уравнения Эйлера на функции \hat{x} . Второе условие эквивалентно неотрицательности функционала

$$K(h(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} \left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \dot{h}^2(t) + 2\hat{L}_{x\dot{x}}(t) \dot{h}(t)h(t) + \hat{L}_{xx}(t)h^2(t) \right) dt \geq 0$$

$$\forall h \in C_0^1([t_0, t_1]).$$

Из неотрицательности и вида функционала K следует, что функция $\bar{h}(t) \equiv 0$ доставляет абсолютный минимум (слабый) в задаче

$$K(h(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} (\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}} \dot{h}^2 + 2\hat{L}_{x\dot{x}} \dot{h}h + \hat{L}_{xx} h^2) dt \rightarrow \min; h(t_0) = h(t_1) = 0.$$

(P'')

По следствию из леммы о скруглении углов функция $\bar{h} \equiv 0$ доставляет в задаче (P'') и сильный абсолютный минимум. Тогда в силу теоремы 1 о необходимых условиях сильного минимума в задаче (P'') на \bar{h} выполняется условие Лежандра для интегранта

$$\tilde{L}(t, h(t), \dot{h}(t)) := \hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \dot{h}^2(t) + 2\hat{L}_{x\dot{x}}(t) \dot{h}(t)h(t) + \hat{L}_{xx}(t)h^2(t),$$

т.е. $\tilde{L}_{hh}(t) \geq 0 \Leftrightarrow \hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \geq 0 \forall t \in [t_0, t_1]$. Таким образом, условие Лежандра в задаче (P) выполнено.

2) *Вывод условия Якоби.* Предположим противное, что условие Якоби не выполнено, т.е. существует точка $\tau \in (t_0, t_1)$ и нетривиальное ($h \neq 0$) решение $h \in C^1([t_0, t_1])$ уравнения Якоби, для которого $h(t_0) = h(\tau) = 0$. Отметим, что из нетривиальности решения h однородного линейного дифференциального

уравнения второго порядка с условием $h(\tau) = 0$ вытекает, что

$\dot{h}(\tau) \neq 0$. Положим $\tilde{h}(t) = \begin{cases} h(t), & t_0 \leq t \leq \tau, \\ 0, & \tau \leq t \leq t_1. \end{cases}$ Тогда

$$\begin{aligned} K(\tilde{h}(\cdot)) &= \int_{t_0}^{\tau} \left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}} \dot{h}^2 + 2\hat{L}_{\dot{x}x} \dot{h}h + \hat{L}_{xx} h^2 \right) dt = \\ &= \int_{t_0}^{\tau} \left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}} \dot{h}^2 + \hat{L}_{\dot{x}x} h\dot{h} + \hat{L}_{x\dot{x}} \dot{h}h + \hat{L}_{xx} h^2 \right) dt = \\ &= \int_{t_0}^{\tau} \left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}} \dot{h} + \hat{L}_{\dot{x}x} h \right) \dot{h} dt + \int_{t_0}^{\tau} \left(\hat{L}_{x\dot{x}} \dot{h} + \hat{L}_{xx} h \right) h dt = \\ &= \left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}} \dot{h} + \hat{L}_{\dot{x}x} h \right) h \Big|_{t_0}^{\tau} + \\ &+ \int_{t_0}^{\tau} \left(-\frac{d}{dt} \left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}} \dot{h} + \hat{L}_{\dot{x}x} h \right) + \hat{L}_{x\dot{x}} \dot{h} + \hat{L}_{xx} h \right) h dt = 0, \end{aligned}$$

(так как функция h удовлетворяет уравнению Якоби). Таким образом, $K(\tilde{h}) = 0$, а это означает, что $\tilde{h} \in \text{strabsmin}P''$ (наряду с функцией $\bar{h} \equiv 0$) и, следовательно, пара $(\tilde{h}, \tilde{u} = \dot{\tilde{h}})$ является оптимальным управляемым процессом в задаче оптимального управления, получаемой как и в теореме 1, из задачи (P'') . Проводя аналогичные рассуждения, получим, что найдется функция $\tilde{p} \in PC^1([t_0, t_1])$ такая, что для лагранжиана квадратичной задачи $\tilde{L}(t, h, \dot{h}) = \hat{L}_{\dot{x}\dot{x}} \dot{h}^2 + 2\hat{L}_{\dot{x}x} h\dot{h} + \hat{L}_{xx} h^2$ на экстремали \tilde{h} выполняется уравнение

$$\tilde{p}(t) = \tilde{L}_h(t, \tilde{h}(t), \dot{\tilde{h}}(t)) \iff \tilde{p}(t) = 2 \left(\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) \dot{\tilde{h}}(t) + \hat{L}_{\dot{x}x}(t) \tilde{h}(t) \right).$$

Поскольку $\tilde{h}(t) = 0$ при $t > \tau$, то $\tilde{p}(\tau + 0) = 0$ и в силу непрерывности функции \tilde{p}

$$0 = \tilde{p}(\tau - 0) = 2\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(\tau) \dot{\tilde{h}}(\tau - 0) = 2\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(\tau) \dot{h}(\tau) = 0,$$

откуда $\dot{h}(\tau) = 0$ (ибо $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(\tau) \neq 0$ из-за усиленного условия Лежандра). Мы пришли к противоречию с условием $\dot{h}(\tau) \neq 0$. Таким образом, предположение противного неверно, и условие Якоби выполнено. \triangleright

1.4.6 Поле экстремалей

Рассмотрим простейшую задачу вариационного исчисления

$$J(x(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt \rightarrow \inf; \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1. \quad (P)$$

Поле экстремалей в задаче (P) называется множество (иногда говорят “семейство”) экстремалей $\{x(\cdot, \lambda)\}$, $x(\cdot, \cdot) \in C^1([t_0, t_1] \times \Lambda, \mathbb{R}^n)$, с параметром $\lambda \in \Lambda \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$ ($\Leftrightarrow \Lambda$ — некоторое открытое множество в пространстве \mathbb{R}^n). (Напомним, что экстремаль — это функция, удовлетворяющая уравнению Эйлера.)

Если для поля экстремалей существует точка (t_*, x_*) такая, что $x(t_*, \lambda) = x_*$ для всех $\lambda \in \Lambda$, то это поле называется *центральной полем экстремалей*, а точка (t_*, x_*) называется *центром поля экстремалей*.

Пусть \hat{x} — допустимая экстремаль в задаче (P) (т. е. экстремаль с заданными в задаче граничными условиями). Говорим, что *экстремаль \hat{x} включена в поле экстремалей $\{x(\cdot, \lambda)\}$* , если $\hat{x}(\cdot) = x(\cdot, \hat{\lambda})$ при некотором $\hat{\lambda} \in \Lambda$.

Говорим, что *экстремаль \hat{x} , включенная в поле экстремалей, окружена полем экстремалей*, если существует окрестность G графика $\Gamma_{\hat{x}}$ такая, что для любой точки (τ, ξ) из этой окрестности имеется единственная экстремаль семейства, проходящая через эту точку; причем функция $\lambda: G \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\lambda = \lambda(\tau, \xi)$, должна быть класса $C^1(G)$. Единственность экстремали, проходящей через точку (τ, ξ) , означает, что по точке $(\tau, \xi) \in G$ значение $\lambda = \lambda(\tau, \xi)$ отыскивается единственным образом.

Функция $u: G \rightarrow \mathbb{R}^n$, $u(\tau, \xi) = \left. \frac{d}{dt} x(t, \lambda(\tau, \xi)) \right|_{t=\tau} =: \dot{x}(\tau, \lambda(\tau, \xi))$ называется *функцией наклона поля*. Отметим, что на экстрема-

ли \hat{x} функция наклона поля $u(t, \hat{x}(t)) \equiv \hat{x}(t)$ совпадает с производной функции $\hat{x}(t)$.

Пример (гармонический осциллятор).

$$\int_{t_0}^{t_1} (\dot{x}^2 - x^2) dt \rightarrow \min; \quad x(t_0) = x(t_1) = 0 \quad (0 < t_0 < t_1 < \pi).$$

Уравнение Эйлера $\ddot{x} + x = 0$. Экстремали этого функционала имеют вид $x(t) = C_1 \sin t + C_2 \cos t$. Допустимая экстремаль $\hat{x}(t) \equiv 0$. Совокупность экстремалей $x(t, \lambda) = \lambda \sin t$ есть центральное поле экстремалей с центром в точке $(0,0)$, включающее, в частности, экстремаль \hat{x} при $\lambda = 0$, покрывающее полосу $0 < t < \pi$.

Найдем экстремаль поля, проходящую через точку (τ, ξ) ($0 < \tau < \pi$):

$$x(\tau, \lambda) = \xi \Leftrightarrow \lambda \sin \tau = \xi \Leftrightarrow \lambda = \frac{\xi}{\sin \tau} \Rightarrow x(t, \lambda(\tau, \xi)) = \frac{\xi}{\sin \tau} \sin t.$$

Функция наклона поля

$$u(\tau, \xi) = \left. \frac{d}{dt} x(t, \lambda(\tau, \xi)) \right|_{t=\tau} = \left. \frac{d}{dt} \frac{\xi}{\sin \tau} \sin t \right|_{t=\tau} = \xi \operatorname{ctg} \tau.$$

Построение центрального поля экстремалей

Теорема. Пусть $\hat{x} \in C^2([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ — допустимая экстремаль в задаче (P) ($\hat{x} \in DE(P)$), интегрант L трижды непрерывно дифференцируем в некоторой окрестности расширенного графика $\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}$ ($L \in C^3(\mathcal{O}(\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}))$), на \hat{x} выполнены усиленные условия Лежандра и Якоби. Тогда \hat{x} можно окружить центральным полем экстремалей.

S-функция и ее дифференциал

Пусть $x(\cdot, \lambda)$ — дважды непрерывно дифференцируемое центральное поле экстремалей с центром в точке (t_*, x_*) , окружающее допустимую экстремаль $\hat{x}(\cdot)$, и интегрант L — дважды непрерывно дифференцируем в некоторой окрестности расширенного графика функции $\hat{x}(\cdot)$ ($L \in C^2(\mathcal{O}(\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}))$). Функция

$$S(\tau, \xi) = \int_{t_*}^{\tau} L(t, x(t, \lambda(\tau, \xi)), \dot{x}(t, \lambda(\tau, \xi))) dt$$

называется *S-функцией центрального поля* $x(\cdot, \lambda)$. Найдем дифференциал S-функции. Он понадобится нам для вывода основной формулы Вейерштрасса при доказательстве достаточных условий сильного экстремума. Для нахождения частных производных S-функции нам понадобятся некоторые полезные соотношения. Имеем по определению поля и функции наклона поля тождество

$$x(\tau, \lambda(\tau, \xi)) = \xi.$$

Дифференцируя обе части этого тождества по τ , получим

$$\begin{aligned} \dot{x}(\tau, \lambda(\tau, \xi)) + x_\lambda(\tau, \lambda(\tau, \xi))\lambda_\tau(\tau, \xi) &= 0 \implies \\ -x_\lambda\lambda_\tau &= \dot{x}(\tau, \lambda(\tau, \xi)) \stackrel{\text{def}}{=} u(\tau, \xi) \end{aligned} \quad (\tau)$$

($u(\tau, \xi)$ — функция наклона поля). Дифференцируя обе части тождества по ξ , получим

$$x_\lambda(\tau, \lambda(\tau, \xi))\lambda_\xi(\tau, \xi) = I \quad (\xi)$$

(I — единичная матрица). Поскольку (t_*, x_*) — центр поля, то $x(t_*, \lambda) = x_*$ для любого λ , и, значит, выполняется следующее соотношение

$$x_\lambda(t_*, \lambda(\tau, \xi)) = 0 \quad \forall (\tau, \xi) \in \mathcal{O}(\Gamma_{\hat{x}\hat{x}}). \quad (*)$$

Найдем $\frac{\partial S}{\partial \tau}$, дифференцируя по τ интеграл с переменным верхним пределом, и используя непрерывность \dot{x}_λ , вытекающую из того, что $x(\cdot, \lambda) \in C^2$. Имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial \tau} &= L(\tau, \xi, u(\tau, \xi)) + \int_{t_*}^{\tau} \left(L_x(t, x(t, \lambda(\tau, \xi)), \dot{x}(t, \lambda(\tau, \xi))) x_\lambda(t, \lambda(\tau, \xi)) \lambda_\tau(\tau, \xi) \right. \\ &+ L_{\dot{x}}(t, x(t, \lambda(\tau, \xi)), \dot{x}(t, \lambda(\tau, \xi))) \dot{x}_\lambda(t, \lambda(\tau, \xi)) \lambda_\tau(\tau, \xi) \left. \right) dt = L(\tau, \xi, u) + \\ &+ \int_{t_*}^{\tau} (L_x x_\lambda \lambda_\tau + L_{\dot{x}} \dot{x}_\lambda \lambda_\tau) dt = L(\tau, \xi, u) + \int_{t_*}^{\tau} L_x x_\lambda \lambda_\tau dt + \int_{t_*}^{\tau} L_{\dot{x}} dx_\lambda \lambda_\tau = \\ &= L(\tau, \xi, u) + L_{\dot{x}} x_\lambda \lambda_\tau \Big|_{t_*}^{\tau} + \int_{t_*}^{\tau} \left(-\frac{d}{dt} L_{\dot{x}} + L_x \right) x_\lambda \lambda_\tau dt = \\ &\stackrel{(\tau), (*)}{=} L(\tau, \xi, u(\tau, \xi)) - L_{\dot{x}}(\tau, \xi, u(\tau, \xi)) u(\tau, \xi). \end{aligned}$$

При выводе мы воспользовались тем, что функции $x(\cdot, \lambda)$ — экстремали, т. е. удовлетворяют уравнению Эйлера.

Формула для $\frac{\partial S}{\partial \xi}$ выводится аналогично. Дифференцируя по ξ , получим

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial \xi} &= \int_{t_*}^{\tau} (L_x x_\lambda \lambda_\xi + L_{\dot{x}} \dot{x}_\lambda \lambda_\xi) dt = \int_{t_*}^{\tau} L_x x_\lambda \lambda_\xi dt + \int_{t_*}^{\tau} L_{\dot{x}} dx_\lambda \lambda_\xi = \\ &= L_{\dot{x}} x_\lambda \lambda_\xi \Big|_{t_*}^{\tau} + \int_{t_*}^{\tau} \left(-\frac{d}{dt} L_{\dot{x}} + L_x \right) x_\lambda \lambda_\xi dt \stackrel{(\xi), (*)}{=} L_{\dot{x}}(\tau, \xi, u(\tau, \xi)). \end{aligned}$$

Таким образом, имеет место следующая формула для дифференциала функции S :

$$\begin{aligned} dS(\tau, \xi) &= \frac{\partial S}{\partial \tau} d\tau + \frac{\partial S}{\partial \xi} d\xi = \\ &= \left(L(\tau, \xi, u(\tau, \xi)) - L_{\dot{x}}(\tau, \xi, u(\tau, \xi))u(\tau, \xi) \right) d\tau + L_{\dot{x}}(\tau, \xi, u(\tau, \xi)) d\xi. \end{aligned}$$

Основная формула Вейерштрасса

В частности, для произвольной функции $x(\cdot) \in PC^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ формула для дифференциала функции S примет вид:

$$\begin{aligned} dS(t, x(t)) &= \left(L(t, x(t), u(t, x(t))) - L_{\dot{x}}(t, x(t), u(t, x(t)))u(t, x(t)) \right) dt + \\ &\quad + L_{\dot{x}}(t, x(t), u(t, x(t))) dx(t) = \\ &= \left(L(t, x(t), u(t, x(t))) + L_{\dot{x}}(t, x(t), u(t, x(t))) (\dot{x}(t) - u(t, x(t))) \right) dt. \end{aligned} \tag{1}$$

В таком виде мы ей и будем пользоваться в дальнейшем. Отметим также, что поскольку $u(t, \hat{x}(t)) = \dot{\hat{x}}(t)$, то из соотношения (1)

$$dS(t, \hat{x}(t)) = \hat{L}(t) dt. \tag{2}$$

Поэтому для допустимой экстремали $\hat{x}(\cdot)$ и для произвольной допустимой функции $x(\cdot)$ имеем равенство

$$J(\hat{x}) = \int_{t_0}^{t_1} \hat{L}(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} dS(t, \hat{x}(t)) = S(t_1, x_1) - S(t_0, x_0) = \int_{t_0}^{t_1} dS(t, x(t)).$$

Следовательно, по формуле (1)

$$J(x) - J(\hat{x}) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt - \int_{t_0}^{t_1} dS(t, x(t)) =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{t_0}^{t_1} \left(L(t, x(t), \dot{x}(t)) - L(t, x(t), u(t, x(t))) - L_{\dot{x}}(t, x(t), u(t, x(t))) \times \right. \\
&\quad \left. \times (\dot{x}(t) - u(t, x(t))) \right) dt = \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{E}(t, x(t), u(t, x(t)), \dot{x}(t)) dt.
\end{aligned}$$

Эту формулу называют *основной формулой Вейерштрасса*.

1.4.7 Достаточные условия слабого экстремума

Теорема 3. Пусть функция $\hat{x} \in C^2([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ — допустимая экстремаль в задаче (P), интегрант L трижды непрерывно дифференцируем в некоторой окрестности расширенного графика $\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}$ ($L \in C^3(\mathcal{O}(\Gamma_{\hat{x}\dot{\hat{x}}}))$), на \hat{x} выполнены усиленные условия Лежандра и Якоби. Тогда \hat{x} доставляет слабый локальный минимум ($\hat{x} \in wlocmin P$). [АТФ, с. 377]

1.4.8 Достаточные условия сильного экстремума

Теорема 4. Пусть функция $\hat{x} \in C^2([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ — допустимая экстремаль в задаче (P), интегрант $L \in C^3(V \times \mathbb{R}^n)$, где $V \subset \mathbb{R}^{n+1}$ — некоторая окрестность графика $\Gamma_{\hat{x}}$, на \hat{x} выполнены усиленные условия Лежандра и Якоби, интегрант L является выпуклым по \dot{x} на V . Тогда \hat{x} доставляет сильный локальный минимум ($\hat{x} \in strlocmin P$).

Доказательство. Условия теоремы позволяют (см. п. 1.4.6) окружить \hat{x} центральным полем экстремалей $x(\cdot, \lambda)$, покрывающем некоторую окрестность $U \subset V$ графика $\Gamma_{\hat{x}}$. Пусть $x \in PC^1([t_0, t_1])$ — произвольная допустимая функция, график Γ_x которой расположен в этой окрестности. Тогда по основной формуле Вейерштрасса п. 1.4.6

$$J(x) - J(\hat{x}) = \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{E}(t, x(t), u(t, x(t)), \dot{x}(t)) dt \geq 0,$$

поскольку L выпукло по \dot{x} для $(t, x) \in U$, следовательно, $\mathcal{E}(t, x, u, \dot{x}) \geq 0 \forall (u, \dot{x}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Значит, $J(x) \geq J(\hat{x})$, т.е. функция \hat{x} доставляет сильный минимум. \triangleright

Рассмотрим случай, когда интегрант $L = L(\dot{x})$:

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(\dot{x}(t)) dt \rightarrow \min; x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1. \quad (P')$$

Теорема 4'. Пусть $\hat{x} \in DE(P')$, $L_{\dot{x}} \in C(\mathcal{O}(\hat{x}))$, на \hat{x} выполнено условие Вейерштрасса. Тогда $\hat{x} \in \text{absmin } P'$.

\triangleleft Уравнение Эйлера:

$$-\frac{d}{dt}L_{\dot{x}} + L_x = 0 \Leftrightarrow -\frac{d}{dt}L_{\dot{x}} = 0 \Leftrightarrow L_{\dot{x}} = C \Leftrightarrow \dot{x} = C'$$

На экстремали \hat{x} выполняется условие Вейерштрасса \Rightarrow

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t), u) &= L(t, \hat{x}(t), u) - L(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)) - \hat{L}_{\dot{x}}(t)(u - \dot{\hat{x}}(t)) \geq 0 \\ &\quad \forall u \in \mathbb{R}, \forall t \in [t_0, t_1] \\ \implies L(u) - L(\dot{\hat{x}}) - C(u - \dot{\hat{x}}) &\geq 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Возьмем произвольную допустимую функцию в задаче на сильный экстремум ($x \in D(P(S))$). Тогда

$$L(\dot{x}(t)) \geq L(\dot{\hat{x}}) + C(\dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}) \quad \forall t \in [t_0, t_1].$$

Проинтегрируем обе части неравенства:

$$\int_{t_0}^{t_1} L(\dot{x}(t)) dt \geq \int_{t_0}^{t_1} L(\dot{\hat{x}}) dt + C \int_{t_0}^{t_1} (\dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}) dt$$

с учетом равенства $\int_{t_0}^{t_1} \dot{x}(t) dt = x(t_1) - x(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{\hat{x}} dt \quad \forall x \in D(P(S))$. Получим,

$$\int_{t_0}^{t_1} L(\dot{x}(t)) dt \geq \int_{t_0}^{t_1} L(\dot{\hat{x}}) dt \iff J(x) \geq J(\hat{x}) \Rightarrow \hat{x} \in \text{absmin } P'. \quad \triangleright$$

1.4.9 Квадратичный функционал

Одномерный случай.

Рассмотрим простейшую задачу вариационного исчисления с квадратичным функционалом

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} \underbrace{(A\dot{x}^2 + 2C\dot{x}x + Bx^2)}_L dt \rightarrow \min; \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1, \quad (P')$$

где A, B, C — функции от t . Имеем:

$$J'(x)[h] = \int_{t_0}^{t_1} (L_{\dot{x}}\dot{h} + L_x h) dt = 2 \int_{t_0}^{t_1} (A\dot{x}\dot{h} + C\dot{h}x + C\dot{x}h + Bxh) dt, \\ J''(\hat{x})[h, h] = 2 \int_{t_0}^{t_1} \underbrace{(A\dot{h}^2 + 2C\dot{h}h + Bh^2)}_{\tilde{L}} dt = 2J(h).$$

Интегрант квадратичного функционала $\tilde{L}(h) = A\dot{h}^2 + 2C\dot{h}h + Bh^2$ совпадает с L . Следовательно, уравнение Якоби — уравнение Эйлера для \tilde{L} — совпадает с уравнением Эйлера исходной задачи.

Для квадратичных функционалов по формуле Тейлора имеет место равенство

$$J(\hat{x} + h) = J(\hat{x}) + J'(\hat{x})[h] + \frac{1}{2}J''(\hat{x})[h, h].$$

Если $\hat{x} \in DE(P)$, то как было показано в Главе 3, §1 $J'(\hat{x})[h] = 0 \quad \forall h \in C_0^1[t_0, t_1]$, что эквивалентно уравнению Эйлера. Поскольку $J''(\hat{x})[h, h] = 2J(h)$, то на допустимой экстремали \hat{x}

$$J(\hat{x} + h) = J(\hat{x}) + J(h) \quad \forall h \in C_0^1[t_0, t_1]. \quad (*)$$

Теорема 5. Пусть $A, C \in C^1[t_0, t_1]$, $B \in C[t_0, t_1]$; выполнено усиленное условие Лежандра \Rightarrow если выполнено усиленное условие Якоби, то допустимая экстремаль существует, единственна и доставляет абсолютный минимум. Если же не выполнено условие Якоби, то значение задачи $S_{absmin} = -\infty$.

◁ Существование допустимой экстремали. Если выполнено усиленное условие Якоби, то $\exists h_0, h_1$ — решения уравнения Эйлера (совпадающего для квадратичной задачи с уравнением Якоби), удовлетворяющие краевым условиям $h_1(t_0) = 0, h_1(t_1) = 1, h_0(t_1) = 0, h_0(t_0) = 1$. Тогда функция $\hat{x}(t) = h_0(t)x_0 + h_1(t)x_1$ является допустимой экстремалью.

Единственность. Если существует другая допустимая экстремаль $\bar{x} \in DE(P'), \bar{x} \neq \hat{x}$, то $h = \hat{x} - \bar{x} \neq 0$ тоже является решением уравнения Якоби с условиями $h(t_0) = h(t_1) = 0$, что противоречит выполнению усиленного условия Якоби.

Экстремаль \hat{x} можно (см. теорему о построении центрального поля экстремалей) окружить центральным полем экстремалей, покрывающем полосу $t_0 \leq t \leq t_1$, с функцией наклона поля $u(\tau, \xi)$.

Возьмем произвольную допустимую функцию $x(\cdot)$. Тогда по основной формуле Вейерштрасса

$$J(x) - J(\hat{x}) = \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{E}(t, x(t), u(t, x(t)), \dot{x}(t)) dt =$$

$$\int_{t_0}^{t_1} (L(t, x, \dot{x}) - L(t, x, u) - L_{\dot{x}}(t, x, u)(\dot{x} - u)) dt =$$

(поскольку для квадратичной функции по формуле Тейлора $L(\dot{x}) - L(u) - L'(u)(\dot{x} - u) = \frac{1}{2}L''(u)(\dot{x} - u)^2$)

$$= \int_{t_0}^{t_1} \frac{1}{2} L_{\dot{x}\dot{x}}(t, x, u)(\dot{x} - u)^2 dt = \int_{t_0}^{t_1} A(t)(\dot{x} - u)^2 dt \geq 0,$$

т.к. $A(t) > 0$ по усиленному условию Лежандра. Значит, $\hat{x} \in \text{absmin } P'$.

Предположим, что не выполнено условие Якоби. Тогда функ-

ция $\bar{h} \equiv 0$ не доставляет абсолютный минимум в задаче

$$J(h) = \int_{t_0}^{t_1} (Ah^2 + 2Chh + Bh^2) dt \rightarrow \min; \quad h(t_0) = h(t_1) = 0 \quad (P'')$$

(если $\bar{h} \equiv 0 \in \text{absmin } P'' \Rightarrow$, то по теореме о необходимых условиях слабого минимума выполнено условие Якоби). Значит, $S_{\text{absmin } P''} < 0$. Поэтому существует функция $h \in C_0^1([t_0, t_1])$ такая, что $J(h) < 0$. Но тогда в силу соотношения (*)

$$J(\hat{x} + \lambda h) = J(\hat{x}) + J(\lambda h) = J(\hat{x}) + \lambda^2 J(h) \rightarrow -\infty$$

при $\lambda \rightarrow +\infty$, т. е. $S_{\text{absmin } P'} = -\infty$. \triangleright

1.5 Теорема Боголюбова

Рассмотри простейшую задачу вариационного исчисления

$$J(x(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x, \dot{x}) dt \rightarrow \min; \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1. \quad (P)$$

Теорема. Пусть $L: \mathbb{R}^{2n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывный интегрант, $\tilde{L}(t, x, \cdot)$ — вторая сопряженная (в смысле выпуклого анализа) функции $\dot{x} \rightarrow L(t, x, \dot{x})$. Рассмотрим задачу

$$\tilde{J}(x(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} \tilde{L}(t, x, \dot{x}) dt \rightarrow \min; \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1. \quad (\tilde{P})$$

Тогда $S_{\text{absmin } P} = S_{\text{absmin } \tilde{P}}$. Более того, для любой допустимой функции $x \in PC^1[t_0, t_1]$ существует последовательность гладких допустимых функций $\{x_k(\cdot) \in C^1[t_0, t_1]\}_{k \geq 1}$ такая, что $x_k(\cdot) \xrightarrow{C[t_0, t_1]} x(\cdot)$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} J(x_k) = \tilde{J}(\hat{x})$.

1.6 Примеры

Пример 1. Исследуем с помощью условий второго порядка задачу, рассмотренную нами в п. 1.2:

$$J(x(\cdot)) = \int_0^1 \dot{x}^3 dt \rightarrow \min; \quad x(0) = 0, \quad x(1) = 1.$$

Мы выяснили ранее, что имеется единственная допустимая экстремаль $\hat{x} = t$, доставляющая слабый локальный минимум в задаче и не доставляющая сильного. При этом нами была построена последовательность допустимых (в задаче на сильный экстремум) функций $x_n \in PC^1([t_0, t_1])$, $x_n(\cdot) \rightarrow \hat{x}(\cdot)$ в метрике пространства $C([t_0, t_1])$, для которой $J(x_n(\cdot)) \rightarrow -\infty$ при $n \rightarrow \infty$.

Поскольку $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) = 6\dot{x}(t) = 6 > 0 \forall t \in [0, 1]$, то выполняется усиленное условие Лежандра.

Выпишем уравнение Якоби, которое является уравнением Эйлера по h для интегранта $\tilde{L} = \hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}\dot{h}^2 + 2\hat{L}_{\dot{x}h}\dot{h}h + \hat{L}_{hh}h^2 = 6\dot{h}^2$:

$$-\frac{d}{dt}\tilde{L}_h(t) + \tilde{L}_h(t) = 0 \iff -\frac{d}{dt}12\dot{h} = 0 \iff \ddot{h} = 0.$$

Общее решение уравнения Якоби: $h = C_1t + C_2$. Начальным условиям $h(0) = 0$, $\dot{h}(0) = 1$, удовлетворяет функция $\hat{h}(t) = t$. Эта функция не имеет нулей в полуинтервале $(0, 1]$. Значит, сопряженных точек нет, и стало быть выполнено усиленное условие Якоби. По теореме 3 выполнено достаточное условие слабого локального минимума, значит $\hat{x} \in \text{wlocmin}$.

Поскольку функция $L = \dot{x}^3$ не выпукла по \dot{x} , то достаточное условие сильного минимума не выполняется. Проверим необходимое условие сильного минимума — условие Вейерштрасса:

$$\begin{aligned} E(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}, u) &= L(t, \hat{x}, u) - L(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) - \hat{L}_{\dot{x}}(t)(u - \dot{\hat{x}}) = u^3 - \dot{\hat{x}}^3 - 3\dot{\hat{x}}^2(u - \dot{\hat{x}}) = \\ &= u^3 - 1 - 3(u - 1) \geq 0 \quad (?) \quad \forall u \in \mathbb{R}, \quad \forall t \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Оно не выполняется. Так как не выполняется необходимое условие, то функция \hat{x} не доставляет сильного локального минимума.

Ответ. Единственная допустимая экстремаль $\hat{x} = t \in \text{wlocmin}$, $\hat{x} \notin \text{strlocmin}$, $S_{\text{absmin}} = -\infty$.

Пример 2.

Исследуем с помощью условий второго порядка задачу, рассмотренную нами в главе 3 п. 1.6 (пример 2):

$$J(x(\cdot)) = \int_0^{3\pi/2} (\dot{x}^2 - x^2) dt \rightarrow \min; \quad x(0) = x\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0.$$

Уравнение Эйлера: $\ddot{x} + x = 0$.

Мы выяснили ранее, что в задаче имеется единственная допустимая экстремаль $\hat{x} = 0$, не доставляющая даже слабого локального минимума в задаче. При этом нами была построена последовательность допустимых функций $x_\lambda(t) = \lambda \sin \frac{2t}{3}$, $x_\lambda(\cdot) \rightarrow \hat{x}(\cdot)$ в метрике пространства $C^1([0, 1])$, для которых $J(x_\lambda(\cdot)) < 0 = J(\hat{x}(\cdot))$ и $S_{\text{absmin}} = -\infty$.

Поскольку $\hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}(t) = 2 > 0 \forall t \in \left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$, то выполняется усиленное условие Лежандра.

Выпишем уравнение Якоби, которое является уравнением Эйлера по h для интегранта $\tilde{L} = \hat{L}_{\dot{x}\dot{x}}\dot{h}^2 + 2\hat{L}_{\dot{x}x}\dot{h}h + \hat{L}_{xx}h^2 = 2\dot{h}^2 - 2h^2$:

$$-\frac{d}{dt}\tilde{L}_h(t) + \tilde{L}_h(t) = 0 \iff \ddot{h} + h = 0 \iff h = C_1 \sin t + C_2 \cos t.$$

Начальным условиям $h(0) = 0$, $\dot{h}(0) = 1$, удовлетворяет функция $\hat{h}(t) = \sin t$. Эта функция в интервале $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ обращается в ноль в точке $\tau = \pi$. Таким образом, в интервале $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ имеется сопряженная точка, и стало быть не выполнено необходимое

условие Якоби слабого локального минимума, значит, допустимая экстремаль \hat{x} не доставляет в задаче слабый минимум, и тем более не доставляет сильный минимум.

Если воспользоваться теоремой 5 о необходимых и достаточных условиях экстремума в простейшей задаче вариационного исчисления с квадратичным функционалом, то из того, что не выполнено условие Якоби, будет следовать, что абсолютный минимум в задаче равен $-\infty$.

Уравнение Эйлера совпало с уравнением Якоби. Это не случайно. Так бывает, если интегрант исходной задачи является квадратичной функцией от x, \dot{x} .

Ответ. Единственная допустимая экстремаль $\hat{x} = 0 \notin \text{wlocmin}$ и, тем более, $\hat{x} \notin \text{strlocmin}$, $S_{\text{absmin}} = -\infty$.